



Certaines personnes peuvent présenter des complications graves :

DENGUE

Hémorragie
(perte de sang importante)

* La prise d'aspirine ou d'ibuprofène augmente le risque d'hémorragie

ZIKA

- Syndrome de Guillain Barré
- Malformations congénitales du système nerveux chez le nouveau-né de mère infectée pendant la grossesse

CHIKUNGUNYA

Complications sévères chez le nouveau-né infecté pendant l'accouchement

DENGUE



- Fièvre (39/40°C)
- Maux de tête
- Courbatures
- Plaques rouges sur le corps

ZIKA



- Fièvre (38-38,5°C)
- Maux de tête, fatigue
- Courbatures
- Douleurs articulaires
- Eruption cutanée sur le corps et le visage +/- démangeaisons
- Conjonctivite, yeux rouges

CHIKUNGUNYA



- Fièvre (39/40°C)
- Maux de tête, fatigue
- Douleurs articulaires, parfois persistantes ou récidivantes

Si vous présentez plusieurs de ces signes :

Protégez-vous des piqures

Vous éviterez ainsi de contaminer votre entourage

Consultez un médecin

Cela déclenchera une action de démoustication par les services municipaux

Eliminez les gîtes larvaires


Au moins une fois par semaine

NE PRENEZ NI ASPIRINE NI IBUPROFENE *

Pour éviter de tomber malade...

Pour éviter de transmettre la maladie à d'autres...

Protégez-vous




Les répulsifs cutanés efficaces (recommandés)



| Substances actives et concentrations | | Nombre maximal d'application(s) quotidienne(s) | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|--|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|
| | | ≥ 6 mois et tant que l'enfant ne marche pas | Dès que l'enfant marche et jusqu'à 2 ans | >24 mois à 12 ans | > 12 ans | Femmes enceintes |
| DEET | 20% -30% | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | 34% - 50% | Ne pas utiliser | Ne pas utiliser | Utilisable uniquement si épidémie | 3 | Utilisable uniquement si épidémie |
| IR3535 | 20% | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | 25%- 35% | Ne pas utiliser | Ne pas utiliser | 2 | 3 | Ne pas utiliser |
| KBR3023 (icaridipine) | 20% | Ne pas utiliser | Ne pas utiliser | 2 | 3 | 3 |
| | 25% | Ne pas utiliser | Ne pas utiliser | 2 | 3 | Ne pas utiliser |
| PMDRBO | 19% à 25% | 1 | 2 | 2 | 3 | Ne pas utiliser |

Les répulsifs cutanés inefficaces (non-recommandés)



- IR 3535 à 10 ou 15%
- DEET à 7%
- Picaridine à 9,3 ou 10%
- Citronnelle
- Bracelets anti-moustiques
- Huiles essentielles
- Appareils à ultrasons
- Homéopathie
- Rubans/papiers/autocollants gluants sans insecticide



Les conseils du pharmacien:



Quel répulsif choisir?

Votre pharmacien pourra vous aider à faire le choix d'un répulsif efficace qui vous convient


Vous avez des lésions

cutanées? Eviter les zones lésées et rincez soigneusement si vous en avez mis par erreur



Vous êtes enceinte...

- Utiliser de préférence une moustiquaire imprégnée d'insecticide
- Porter des manches longues et pantalons amples
- Limiter les sorties, en particulier au lever et coucher du soleil
- Utiliser la concentration minimale efficace



Et le visage? Vous pouvez vous mettre du répulsif sur le visage, mais pas directement! Mettez-le sur vos mains d'abord, puis étaler le sur le visage en évitant les yeux et la bouche.

Vous allaitez...

Ne pas appliquer le répulsif au niveau du sein et se laver les mains avant la mise au sein

Vous avez des enfants...

- Mêmes conseils que pour les femmes enceintes
- Le répulsif doit être appliqué par un adulte
- Ne pas appliquer de répulsif sur les mains des enfants

Répulsif et crème

solaire? Appliquez la crème solaire au moins 20 minutes avant le répulsif

Vous portez des lentilles?

Evitez de manipuler vos lentilles après application d'un répulsif (risque d'irritation des yeux et d'altération des lentilles, notamment avec le DEET)

Vous êtes asthmatiques?

Evitez la manipulation de perméthrine (insecticide) et privilégiez les vêtements et/ou moustiquaires imprégnés

La totale?

- Portez des vêtements amples, couvrants, imprégnés d'insecticide (pyréthrine),
- Utilisez un répulsif cutané sur les zones découvertes
- Fermer les fenêtres et mettez la clim ou le ventilateur
- Dormez sous une moustiquaire
- Utilisez les insecticides à diffusion continue pour l'intérieur